


TYLO p.c

Injection

Gold

Tylosin tartrate + Thiamphenicol + Prednisolone acetate

Effective against gram positive, gram negative
&
mycoplasmal infections.



জীবাণুর যম্
.....



টাইলো পি.সি

ইনজেকশন

গোল্ড

Composition:

Tylosin tartrate	57.5 mg
Thiamphenicol	200 mg
Prednisolone acetate	5 mg

Description:

Tylo-PC gold is a broad-spectrum antibiotic and indicated for the treatment and control of conditions caused by or associated with tylosin and Thiamphenicol sensitive organisms in cattle, horse, calf, sheep & goat.

Indication:

For the treatment and control of a wide range of common systemic respiratory, gastrointestinal, septicemia and local infections caused by, or associated with organisms sensitive to tylosin and Thiamphenicol.

It is also used for the treatment of gram positive, gram negative & mycoplasmal infections.

Cattle, Buffalo: Pneumonia, bronchitis, pasteurellosis, metritis, foot-rot, mastitis, and septicemia.

Calf, goat and sheep: Pneumonia, pasterellosis, mastitis-metritis-agalactia (MMA) syndrome, septicemia, bacterial diarrhea and enteritis.

Mode of Action:

Tylosin has a bacteriostatic effect on a susceptible organisms caused by inhibition of protein synthesis through binding to the 50S subunit of the bacterial ribosome.

Dosage and Administration:

Cattle & Buffalo: 3-6 ml/100 kg BW intramuscular injection

Calf, goat and sheep: 1ml/10 kg BW intramuscular injection.

Or, As directed by the veterinary physician

Withdrawal Period:

Meat: 21 days, Milk: 7 days,

Pack size:

100 ml vial.

Storage:

Store in a cool and dry place. Protected from light. Keep out of the reach of children.

উপাদান:

টাইলোসিন টারট্রেট	৫৭.৫ মিগ্রা
থায়ামফেনিকল	২০০ মিগ্রা
প্রেডনিসলোন এসিটেট	৫ মিগ্রা

বর্ণনা:

টাইলো পি.সি গোল্ড ইনজেকশন একটি ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক। যা টাইলোসিন এবং থায়ামফেনিকল এর প্রতি সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা সংঘটিত গরু, মহিষ, বাছুর, ভেড়া ও ছাগলের রোগের চিকিৎসায় কার্যকর।

নির্দেশনা:

টাইলোসিন এবং থায়ামফেনিকল এ সংবেদনশীল জীবাণুর চিকিৎসায় এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, পরিপাক তন্ত্রের সংক্রমণ, সেপটিসেমিয়া এবং স্থায়ী সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

গ্রাম পজেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং মাইকোপ্লাজমাল ইনফেকশনের চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর।

গরু, মহিষ: নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, পাস্টুরেলোসিস, মেট্রাইটিস, পা-পঁচা, ম্যাস্টাইটিস এবং সেপটিসেমিয়া ইত্যাদি সংক্রমণে ব্যবহার্য।

বাছুর, ছাগল ও ভেড়া: নিউমোনিয়া, পাস্টুরেলোসিস, ম্যাস্টাইটিস-মেট্রাইটিস-এগালেকটিক (MMA) সিন্ড্রোম, সেপটিসেমিয়া, ব্যাকটেরিয়াল ডায়রিয়া এবং অন্ত্রের প্রদাহ।

যে ভাবে কাজ করে:

টাইলোসিন ব্যাকটেরিয়ার রাইবোসোম এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন সিনথেসিস কে বাধা প্রদান করে ফলে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ব্যহত হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

গরু, মহিষ:

৩-৬ মিলি প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।

বাছুর, ছাগল ও ভেড়া:

১ মিলি প্রতি ১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।

অথবা, ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য

প্রত্যাহার কাল:

মাংস: ২১ দিন, দুধ: ৭ দিন।

প্যাক সাইজ:

১০০ মিলি ভায়াল।

সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

Manufactured by:



8F, Eagle Town Bldg., #278-20, Sungsu-2ga, Sungdong-ku, Seoul, Korea
EL : 82-2-464-9065
web: www.eaglevet.com
Email: stephenkim1202@gmail.com

For Veterinary Use Only

Marketed by:



ACI Limited
245, Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208